

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百十八

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣王鍾泰

膳錄監生臣閻澧

欽定四庫全書

普濟方卷一百十八

明 周王朱橚 撰

寒暑濕門

中熱論

夫濕者天之陰雨宿霧地之山澤蒸氣人或中之必溢於血脉而流於關節也其或久處卑濕常住水涇或冒雨露而行勞傷汗出衣裏冷濕皆能爲病經云濕爲停着左傳曰淫腹疾是以受濕之人一身痛重百節痠痛

四肢腫滿筋脈弛長發熱惡寒小便秘澀大便飧泄也  
若氣不和平濕中稍重亦令人半身不遂口眼喎斜涎  
潮昏塞有類風證治之之法宜利小便治濕不利其小  
便非其治也宜於滲湯方下求之忌不得以火却發汗  
并妄轉瀉濕家誤汗必作瘥令人角弓反張如中風狀  
下之則額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦  
死 寒熱風濕皆能并合爲病故有風濕寒濕溫證各  
不同爲治亦別不可不明辨也風濕者風氣與濕氣相

搏也其證肢體煩重不可轉側筋脈掣痛不得屈伸額上微汗不欲去被或身微腫欲發其汗但熱熱身潤則風濕俱去若大發其汗則風氣去而濕氣相并也其證身體煩疼無汗惡寒發熱脈浮緩而細宜與麻黃白朮湯以發散其表除濕去寒也 中暑者脈沈而細微緩以濕溢肌肉浮則脈沈細夫濕者在天為雨在地為土在人為臟為脾故濕喜歸脾脾虛喜中濕故曰濕流關節之中多使人臃脹四肢關節疼痛而煩久則浮腫

喘滿昏不知人著腎者腰痛身重如坐水中著脾者四肢浮腫不能屈伸挾風則眩暈嘔噦兼寒則拳拳痛或泄瀉發黃身熱鼻塞直視鄭聲虛汗脚氣腹中脹臍下堅次之 夫風濕者是風氣與濕氣共傷於人也風者

八方之虛風濕者水濕之蒸氣若地下濕復少霜雪其山水氣蒸薰值暖燠迎人腠理開便受風濕其狀令人懈惰精神昏憤若經久亦令四肢緩縱不隨入臟則瘡瘕口舌不收或脚痺弱變為脚氣真誥云櫛頭理髮欲得

多過通流血脈散風濕頻更易櫛器用之 夫濕溫者  
其人常傷於濕因而中暑或汗未乾即浴溫熱相搏則  
發濕溫病苦兩脛逆冷又胃多汗頭目痛苦妄言惡寒  
反熱關節盡疼手足倦怠不自勝持其脈陽濡而弱陰  
小而急治在太陰宜與茯苓白朮湯不可發汗汗出必  
不能言耳聾不知所在身清而色變名曰重暍如此者  
醫殺之耳 凡男子婦人小兒手足麻痺肌肉不仁者  
風寒濕三氣相雜至合為痺先用黃芩芍藥湯吐之吐

訖次用通解九通經而瀉之訖更用辛甘之劑汗之汗  
瀉之後可用當歸清涼飲子兼烏荊丸除濕丹和血行  
經之藥則愈矣 凡男子婦人病水濕瀉注不止因服  
豈菟烏梅薑附酸熱之劑經曰陽氣耗減於內陰精損  
削於外三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體痞腫面黃  
腹大小便赤色兩足按之陷而不起內經曰諸濕腫滿  
皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒涼宜於燠室不  
透風處用火一盆藉火力出汗次以導水禹功量病人



虛實瀉十余行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法俱行  
三法行畢臟腑空虛先宜以淡漿粥養腸胃三兩日次  
服五苓益元同煎或燈心湯調下亦可如大勢未盡更  
服神功散可以流濕潤燥分陰陽利水道既平之後宜  
大將息慎忌油鹽酒菓房室等事三年則不復作矣

方

金砂流濕丸治男子婦人雜證及風濕酒濕

木通

一兩  
去皮

澤瀉

一兩  
半

木香

一兩  
兩

白茯苓

去  
皮

大黃

去  
皮  
各一

兩滑石五兩海金砂五錢牽牛頭末五兩郁李仁一兩

右為末滴水丸如桐子大每服五十丸至八十九生

薑湯下忌濕麵如小便不通燈草湯下如傷酒

生薑湯下酒疸食黃蘿蔔湯下痢疾高良薑湯

下婦人血氣不調當歸湯下肢節疼痛溫酒下

心痛者韭根湯下膈氣枳實湯下中風槐角

湯下

除濕丹出宣明論治濕客搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔 甘遂 赤芍藥 葳靈仙 葶藶

各二兩

乳香

一兩研

沒藥

一兩別研

牽牛

半兩

大戟

炒三兩

陳皮

四兩去白

澤瀉

二兩

右為細末麵糊為丸梧桐子大每五十九加至八十

丸食前溫水送下得更衣止後服前後忌酒二日藥

後忌濕麵甘草三兩日食溫淡粥補胃一方無澤瀉

桂苓白朮丸

出御藥院方

治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開

堅結痛悶增進飲食調和臟腑無問寒濕濕熱吐瀉

利皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解  
酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利  
止為度隨證調之

官桂

茯苓

去皮

半夏

已上各

一兩

各

乾生薑

分

白朮

橘

紅皮

去

澤瀉

各半

黃連

半

黃栢

二

兩

右為末麵糊為丸如小豆大每服三五丸生薑湯下

食後服

桂苓白朮散

劉先生

直格方

治傷寒中風冒暑飲食內外一切

所傷傳受溫熱內甚或頭痛口乾或吐瀉損渴或小  
便赤澀大便急痛或瀉痢間作并一切濕熱霍亂吐  
瀉轉筋急痛腹滿或中外諸邪所傷而兼吐瀉者濕

熱尤用之

一名桂苓甘露飲  
方見本方門暑類

舟車九治積聚潮熱有時胃氣不和遍身腫滿或水濕  
蠱氣足腫腹脹氣湊不舒腹腸間結聚大便不通並  
皆治之

甘遂

煨

陳皮

青皮

各一兩

木香

半兩

芫花

醋炒

大戟

漿水

浸一宿  
各一兩  
大黃二兩  
牽牛四兩  
取蠱加蕪荑半兩

右為細末水九梧子大每服六十九量虛實加減食  
前溫水送下以利為度

蒼朮復煎散治寒濕相合腦痛惡寒項筋脊骨脾眼痛  
膝臏痛脈沈洪無力行步身沈重

蒼朮四兩水二碗煎至二大盞去滓入下項藥味羌活錢一升麻 澤瀉

柴胡 藁本 白朮各半錢黃栢三錢紅花少許

右煎去滓稍熱服之空心取微汗為効忌酒濕麵

滲濕湯治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或  
淋大便溏泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗  
出衣裏冷濕久久得之腰下重疼兩脚酸痛腿膝或  
腫或不腫小便癃閉腫疼悉能主之

蒼朮

白朮

甘草

各三錢

乾薑

茯苓

各二兩

橘紅

丁香

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗三枚去滓  
食前溫服煎至六分此藥治脾不和嘔逆惡心大便

時時溏泄尤得其宜一方減橘紅丁香名腎著湯腰重而冷痛者大宜服之或不因濕氣所傷乃是風寒相搏以致腰疼宜服生料五積散仍加桃仁數箇煎服若腎虛致痛當服補藥

栝樓根湯治風濕加渴甚者

石膏

二兩

栝樓根

分三

人參

防風

甘草

炙各半兩

葛根

一兩半生用  
乾者只三錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一中盞去



滓服

尋痛丸治走注流濕已後宜用襲經絡除疼痛

棕閭皮

燒存性  
一兩半

皂莢子仁

二兩  
炒

當歸

去蘆  
頭炒

乳香

別研

沒藥

別研各  
一兩

川山甲

酥炙  
一兩

木香

半兩

麝香

二錢  
別研

右同為細末酒煮麴糊和丸如梧桐子大每服五十  
丸不拘時候溫酒下或木瓜湯送下

滲濕湯治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節重  
疼發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑澹泄項

背強急手足時厥週身麻痺肢體微腫

白朮

二人兩半

乾薑

炮

白芍藥

附子

炮去皮臍

白茯苓

去皮桂枝

不見火

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片大棗三枚煎至八分去滓溫服不拘時

三花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿濕熱腸垢沈積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰

涎嗽頭目眩運瘡疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積  
一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤  
白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛新久瘦弱俗不  
能別辨或泥常法用轉動之藥兼治久新腰痛并一  
切下痢及小兒驚疳積熱乳癖腫滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌溫炒  
各半兩

牽牛

二兩

大黃

一兩  
已上

為輕粉

一錢一方  
無輕粉

右為細末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五

九溫水下每日三服加至快利利後常保養宣通氣  
血稍進酒食病痞悶極甚者使多服則頓攻不開轉  
加痛悶則初服兩九每加兩九至快利為度以意消  
息小兒九如麻子大隨強弱增損三四歲者三五九  
依前法一方崔宣武神祐加黃栢

人參紫苑散治濕熱流注足脛腫痰咳等

人參 川芎

木香

防己

白朮

各一兩

紫苑

去皮

苦葶藶

炒紫色  
各二兩

右爲麤散每服三錢水一大盞生薑四片烏梅一箇  
煎至八分去滓溫服食前日進三服慎濕麵溫酒等  
物

接骨丹逐濕氣定疼痛腫疾並皆治之

骨碎補

去毛  
一斤

敗薑

生地黃

去土淨洗  
各一兩

蒲黃

半斤

白麵

二斤

右爲細末一處拌勻用隔年好米醋熬滾熱調藥放  
溫於痛處如藥冷再用熱醋調敷如此七次用綿包

之大有神効一料分作七處七日用之

除濕湯治寒濕所傷身體重著腰脚酸痛大便澹泄小

便澹利

平胃散加半夏炒 藿香 白茯苓 白朮

右各等分用水二盞薑棗煎服一方去白朮用赤茯

苓

黃耆建中湯治傷濕鼻塞身痛

黃耆

微炙

辣桂

各二兩

甘草

炙二兩

白芍藥

石麤散每服三錢水一盞半薑四片棗三枚煎至八分去滓食前服一方入錫糖少許再煎令溶稍熱服赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澀

葶藶

兩四

防已

兩二

赤茯苓

兩一

木香

兩半

右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服三十九煎桑白皮湯下食前服

牛黃白朮丸治腰脚濕氣

黑牽牛

頭末  
二兩

大黃

二兩

白朮

右為細末滴水丸梧桐子大每服三十丸食前生薑湯下如要快利加至百丸

五加酒方

五加根莖

細剉  
五斗

六月六日麴末

三斗黍米

一石糯  
米亦得

右三味以水五斗共五加同下於大釜中以木度深淺與水平尅之即更添水一石五斗并前計兩石即下火煎旋旋急火取藥汁減下至水尅處卧得以大



盆安淨篋篋中安淨布單煎滓漉著篋中其汁在盆  
中唯有五斗且別盛密封蓋之又重取所漉者五加  
滓以水煮之如別有五加添和同煮更佳取此汁用泔  
米拌飯炊之如常炊法用前五加濃汁漬麴且炊米  
五斗釀之餘五斗分為兩甌如常造酒法酒熟壓漉  
密封頭每服一盞煖食之漸加勿令醉又遠志十兩  
末之下釀中益炒玄參及蛇皮肉亦得其糟與已下  
食之尤佳

補骨脂丸治傷內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之  
藥百端不應唐鄭相公為海南節度七十有五越地  
卑濕服諸藥不應元和七年有訶陵國般主李摩訶  
獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十  
年二月罷郡歸京錄方傳之

破故紙

十兩揀淨為末

胡桃肉

去皮二十兩研如泥

右胡桃肉泥入破故紙末更好煉蜜和勻如飴盛  
磁器中旦日以溫酒化藥一匙服之不飲酒者以溫

熟水化下彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但  
禁食芸臺羊肉

牽牛湯治腹中濕氣足脛微腫中滿氣急咳嗽喘息小  
便不利

黑牽牛

頭末  
一兩

厚朴

薑製  
半兩

右研末每服二錢煎薑湯調下或臨時水九梧桐子  
大薑棗湯下十九亦得

茯苓白朮湯治冒雨滋著於肌膚或因汗出浸漬或因

燥恣得病覺腰重脚弱身體煩痛頭眩等證其脈細弱

白朮

一兩炒

附子

一兩生熟臨時消息

茯苓

去皮半兩

官桂

去麋皮半兩

甘草

半兩

右咬咀每服四錢水二盞生薑七片煎至六分去滓食前服

加味木附湯治中濕脈沈而微緩濕氣歸脾流於關節之中多使人腹腹脹倦怠四肢關節痛疼而煩或一

身重著久則浮腫喘滿昏不知人挾風眩暈嘔噦兼  
寒則攣拳掣痛治之不得猛發汗灼艾通泄惟利小  
便為佳此方主之及治大小便皆自利

白朮

去蘆

甘草

炒一兩

附子

炮一兩半

赤茯苓

一兩

右剉散每服五錢水一盞半薑七片棗三枚煎七分  
日三服纔見身痺又三服當如蛭狀勿怪蓋朮附並  
行皮中逐水氣故爾法合加桂一兩大便堅小便利  
則勿加

木附湯治風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止自汗

白朮

二兩甘草

炒一兩

附子

熟七錢半

右剉細每服三錢薑七片水一盞半煎一盞食後溫服

白朮湯治中濕口噤不知人

用白朮半兩去蘆以酒三盞煎一盞頓服不能飲酒

以水代日三服夜一服鮑氏方云濕氣中脾則膜脹  
四肢痛久則腫喘挾風則眩暈挾寒則攣拳不可大  
發汗不可灼艾泄瀉當利小便大汗或大下皆死

無敵丸

赤土

四兩醋碎

川山甲

蒼朮

自然銅

火煨七次

赤小豆

生用

赤芍藥

山梔子

橘皮

木鱉子

香白芷

木瓜

蘇木

生地黃

熟地黃

荊芥

地龍

蛤粉炒已上各四兩

骨碎補

二兩

晚蚕沙

二斤

當歸

一兩

紫金皮

半斤乳香一兩沒藥一兩大烏頭一箇

右為細末用酒糊為丸如桐子大每服五六十丸酒送下或茶清亦可好醋為丸妙

大橘皮湯治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便

滑洩亦治咳嗽不能卧不敢食

一名白朮  
木香散

橘皮一兩  
去白木香分三滑石六兩檳榔三錢茯苓一兩  
去皮

木猪苓去皮澤瀉白木官桂各半  
兩甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓



溫服大小便祕先服十棗湯二三日後再服此藥一方不用甘草

生附湯治受濕腰痛

附子

生二錢半

蒼朮

炒

杜仲

薑炒各半兩

牛膝

酒浸焙

厚朴

製

乾薑

生

白朮

茯苓

甘草

炙各二錢半

右㕮咀每服三錢薑三片棗三枚水一盞半煎至八分去滓食前服

防己黃耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少

力關節煩疼自洒淅惡風不欲去衣及風水客搏腿  
脚浮腫上輕下重不能屈伸

防已

四兩黃耆

五兩甘草

三兩

白朮

三兩

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片棗三枚同煎  
至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差明  
醫深造治濕不利小便非其治也喘者加麻黃胃中  
不和加芍藥氣上衝加桂下有陳寒加細辛服藥後  
當如虫行皮中腰以下如水服後以下令微汗出瘥

天門冬湯療氣濕體疼惡風微腫

天門冬

三兩去心

葛根

四兩

生薑

三兩

桂心

四兩

麻黃

三兩去節

芍藥

二兩

杏仁

五十枚去皮尖

兩八

甘草

二兩

炙

右切以水一斗煮取三升分三服取汁忌海藻松菜

生葱鯉魚

人參附子湯治風濕身體疼痛欲折肌肉如刀所刺

人參

去頭蘆

黑附子

炮去皮臍

乾薑

炮裂

芍藥

去皮

茯苓

去皮

甘草

炙

桂心

各一錢半

白朮

二錢

右為細末每服二錢水一大盞同煎至七分去滓溫服不拘時候一方去桂用乾地黄二兩

七物獨活湯療脚弱及中風濕緩縱不隨

獨活

五兩

葛根

四兩

乾薑

三兩

桂心

四兩

半夏

四兩

洗

甘草

炙二兩

防風

三兩

右咬咀以水一斗煮取三升每服一升日三得少微汗出好忌羊肉餒海藻松菜生葱

七聖散治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼

痛不能步履

續斷 獨活 防風 杜仲 草薢 牛膝

酒浸一宿

甘草

右各修事淨焙乾半兩為細末每服二錢溫酒調下  
活血應痛丸治風濕客於腎經血脈凝滯腰脚重疼不  
能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭面虛腫耳內常  
鳴下注脚膝重痛少力行履艱難亦治項背拘攣不  
得舒暢常服活血脈壯筋骨使氣脈宣流

狗脊

去毛四斤

蒼朮

米泔浸一宿去皮六斤

香附子

去毛炒七斤半

陳皮

洗去蒂五斤半

沒藥

別研一十二兩

歲靈仙

洗二斤

草烏頭

炮一斤半

右為細末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五粒至二十粒用溫酒或熟水任下不拘時候久服忌桃李雀鴿諸血物

療風濕身體疼痛惡風微腫方

桂心

四兩

麻黃

二兩去節

芍藥

二兩

天門冬

二兩去心

生薑

杏仁

五十枚去皮尖兩人

右呖咀水一斗煮取三升一服一升日三忌鯉魚生

葱海藻松菜

治風濕脈浮身汗出惡風

甘草

二兩黃耆

五兩

漢防已

四兩

生薑

白朮

各三兩

大棗

十二枚

右呖咀水六升煮取汁三升分三服服了坐被中欲解如蠱行皮中卧取汗

麻黃湯療頭風濕面如鍼刺之狀身體有腫惡風汗出

短氣不能飲食

麻黃

四兩

芍藥

一兩

桂枝

一兩

當歸

一兩

杏仁

三十枚

去皮尖

兩

右剉以水五升煮取汁二升去滓分作三服日三糜

粥將息佳

薏苡麻黃湯療風濕身煩疼日晡發熱劇者

一名麻黃  
杏仁薏苡

湯仁

薏苡仁

半斤

一方

用二兩

麻黃

四兩

去節

甘草

二兩

杏仁

二兩

去皮尖

兩

碎人



右咬咀以水五升煮取二升分再服汗出即愈濕家  
煩疼可以甘草麻黃湯發汗不瘥更合飲加白朮四  
兩名白朮麻黃湯忌海藻松菜桃李雀等物  
療風濕百節疼痛不可屈伸汗出

芍藥

四兩

甘草

炙三兩

芍藥

四兩

附子

三兩

炮

右咬咀水五升煮取二升分再服相去十里頃忌猪  
肉海藻松菜等物

甜瓜子丸治風濕相搏腰脚疼痛大有神効

甜瓜子

三兩淨炒黃色

乾木瓜

一兩半去皮穰

葳靈仙

一兩

川烏

兩

炮去皮臍

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送下避風處少息汗出為度服藥後當日忌食熱物及相反藥材畏半夏瓜薑貝母白芨之類凡病在上食後在下食前服之

木瓜丸治風濕客搏手足腰膝不能舉動

木瓜

一斤去皮挖孔

吳茱萸

一兩擇淨

右以茱萸入木瓜內用線繫定蒸爛入青鹽半兩研  
丸如梧桐子大每服四十九空心茶酒任送下牛膝  
酒服之尤佳

治風濕手足腰腿疼痛等證

用猪牙皂角不蛀者一斤剉碎為細末用多年米醋  
熬成膏子夾紙攤貼大効

蒼朮散治風濕常服壯筋骨健步

蒼朮

一斤用粟米泔水浸過用竹刀刮去筋皮半  
斤以童子小便浸半斤無灰好酒浸之良

用春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮於淨地  
上攤一坑以炭火煨紅去炭將浸蒼朮酒小便傾於  
坑內却放蒼朮於坑內用瓦器蓋覆用泥封固經一  
宿取出蒼朮為細末每服二錢空心鹽湯或酒調服  
常服除濕壯筋骨明目

乳香沒藥丸治遠年近日風寒濕氣攻注脚膝或腫或  
痛筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不  
已並宜服之

乳香

別研

沒藥

別研

骨碎

補去

歲靈仙

去土

宿砂仁

白附子

甜瓜子

牛膝

酒浸

當歸

去蘆

乾木瓜

地龍

去土

木鼈子

各一兩

白牽牛

三兩

微炒

右為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服二十九溫

木瓜湯下溫酒亦可不拘時候服

上馬九治寒濕臂痛腿脚疼筋骨諸疾

川烏

炮

木香

半兩

虎骨

酥炙

牛膝

杜仲

杜仲

木瓜

當歸

酒浸

敗龜板

自然銅

醋淬

黃耆

蜜炙

白朮

各一  
兩

右為細末用蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸溫

酒送下

麒麟竭散治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸

各六兩

水蛭

杆碎炒  
令烟盡

麝香

各一錢

虎腦骨

酥炙黃五錢  
一作虎脰骨

右為末和勻每服三錢溫酒調下食前服痛立止甚

者不過二服

應痛丸治寒風損手脚疼痛及諸濕

生蒼朮

斤舶上茴香

十二兩  
微炒

破故紙

一斤半  
炒半生

骨碎補

又名胡絲薑一片樟桂石  
上生亦可旋取上去毛用

川山甲

六兩去  
膜桑灰

炒脹為度榆  
灰亦可用

生草烏

一斤碎剉  
如麥子大

右除草烏一斤用生葱一斤連皮生老薑一斤搗爛

將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥作一處日乾或焙

乾研為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大日一服每

服止五十九酒或湯下病在上食後停片時服病在

下空心服訖忌一時熱物

熨烙當歸散治寒濕流注腰腿疼痛經脈逆滯不得宣

通

防風

去蘆頭

當歸

去蘆頭

藁本

去土獨活

剉去土

荊芥穗

頑荊葉

已上各一兩

右為麤末每服用藥一兩半鹽四兩慢炒令熱用絹

袋盛去痛處熨烙

生附除濕湯

出仁齊直指方

治寒濕交攻身體冷痛



生附子

二兩 蒼朮 二兩 製

白朮

厚朴

製各一兩

木瓜

二錢

粉草

炙三錢

右為末每服六錢重水四盞薑十五片煎取兩盞分作二服又名除濕湯

附子麻黃湯

出三方

治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急

口喎語聲混濁心腹脹氣上喘不能動轉

附子

炮去皮臍

麻黃

去節

白朮

去蘆

乾薑

甘草

炙人參

各等分

右為劉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

麻黃白朮湯

出三方

治寒濕身體疼痛煩無汗惡寒發熱

脈浮緩細

麻黃

去節

桂心

二兩

甘草

炙一兩

杏仁

去皮炒

白朮

四兩

右為劉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前

服

芎朮除眩湯

出醫方大成

治感寒濕頭目眩暈

官桂

甘草

炙二錢半

川芎

附子

白朮

各半兩

右咬咀每服三錢薑七片水一盞半煎至八分去滓

食前服

續斷丸

出街藥院方

治血通關節經絡引滯氣散寒濕治筋

攣骨痛

續斷

萆薢

各二兩剉碎

牛膝

酒浸焙乾

杜仲

去麁皮剉碎炒令絲盡好

乾木瓜

各二兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼溫酒送

下食前服

應痛丸治寒濕氣骨頭到處疼痛不止

甜瓜子 乾木瓜 川烏頭 五靈脂

各二兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸熱酒下病在上食後服病在下食前服

補骨脂散治寒濕氣滯腰膝脚疼腫滿行步艱難

破故紙

炒一兩

黑牽牛

二兩

右為細末用陳皮煎湯下一方用核桃酒下

黃連丸

出宣明論

治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭

目

用黃連好酒不拘多少為末酒麵糊為丸如小豆大  
每服二十九溫水下不計時候日三服

白朮茯苓乾薑湯

出三方

治伏暑中風濕煩渴引飲心腹

疼痛躁悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅畏風微汗飢不  
能食

白朮

乾薑

炮

茯苓

去皮

細辛

桂心

乾葛

甘草

炙陳皮

烏梅

核去豆豉

右等分為細末每服二錢白湯點服不拘時候

茯苓白朮湯

出三方

治冒暑毒加以著濕或汗未乾即浴

皆成暑濕宜服此

茯苓

皮去乾薑

炮甘草

炙白朮

桂心

各一兩

右為剉每服四錢水一盞煎七分去滓食前服一方

加蒼朮炒

增損續斷丸

出本方

治榮衛澁滯少色寒濕從之痺滯關

節不利而痛

川續斷 薏苡仁 牡丹皮 桂心 山芋

白茯苓 黃芪 山茱萸 石解 麥門冬

各一兩

乾地黃 人參 防風 白朮 鹿角膠

各七兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸溫

酒下空心食後

小金丹

草烏

六兩薑蔥各半斤搗爛

蒼朮

四兩米泔浸

地龍

川山甲

敗龜殼 白芷 晚蠶沙 骨碎補 虎骨炙

自然銅 破故紙 何首烏 川萆薢 乳香

沒藥

已上各半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七丸至十五丸茶酒任下忌熱物

### 小金丹真方

蒼朮

四兩去蘆米泔浸一宿

草烏

五兩不去尖去皮米泔浸一宿

葱白

四兩

老薑

四兩



已上共四味一處擣為餅焙乾後加

川烏

兩半

何首烏

兩半

自然銅

兩半

淬七次

醋

地龍

兩半

二蠶沙

兩半破故紙

兩半

酒浸

穿山甲

兩半

炮帶性

火

白芷

兩半

右為細末用好醋糊為丸如桐子大每服十九加至十五丸茶湯或酒任下忌熱物猪羊血豆粉

續斷丸

出本

方

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無

力筋脈緩急宜用

川續斷

草薢

當歸

微炒

附子

防風

天麻

各一

兩乳香 沒藥 各半 川烏 三分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒或飲

湯下空心食前服

桂枝附子湯

出仁齋直指方

治風濕相搏身體疼煩掣痛不可

屈伸汗出短氣小便不利不欲去衣被或身微腫脈

浮弦細濡者

桂枝

去皮四兩

白朮

附子

炮去皮臍各三兩

甘草

二兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三箇煎至七

分去滓空心溫服或大便秘則去桂枝小便不利悸  
氣加茯苓三兩痺則加防已四兩腹痛加芍藥四兩  
身腫汗出加防風一方無白朮

撫芎湯

出濟生方

治濕流關節臂疼手重不仁俛仰或自汗頭

眩痰逆惡心

撫芎

白朮

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水盞半薑七片煎至八分去滓溫  
服不拘時候

羌附湯

出濟生方

治風濕相搏身疼掣煩痛不可屈伸或身

微腫不仁

羌活

去蘆附子

炮去皮臍

白朮

甘草

炙

右各等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時

治脚膝緩弱行履不得

葳靈仙

木瓜

吳白芷

甘草

右等分用酒煎食前服

治風寒濕痺麻木不仁粥法

出本  
事方

右川烏生為末用香熟白米作粥半碗藥末四錢同  
米用慢火熬熟稀薄不要調下薑汁一茶脚許蜜三  
大匙攪勻空心啜之溫為佳如是中濕更入薏苡仁  
末二錢增米作一中碗服 此粥大治手足四肢不  
隨痛不能舉者有此證預服防之左氏云風淫末疾  
謂四肢為四末也脾主四肢若風邪客於肝則淫脾  
脾為肝剋故疾在四末穀氣引風濕之藥徑入脾經故

四肢得安此湯劑極有力予嘗製此方以治人服皆

驗

治脚轉筋 急伸脚將脚緊鉤向前痛即止

薏苡仁散

出本方

治濕傷腎腎不養肝肝自生氣遂成風

濕流注四肢筋骨或入左肩髀肌肉疼痛漸入左指

中

薏苡仁

兩當歸

小川芎

乾薑

甘草

官桂 川烏 防風 茵芋 人參 羌活

白朮 麻黃 獨活

各半兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

加劑除濕湯

出仁齋直指方

治風虛傷濕身重腰疼四肢微冷

或嘔逆或溲泄皆治之

蒼朮

炮

白朮

甘草

炙各一兩

乾薑

炮

茯苓

各二兩

橘皮

辣桂

厚朴

製各半兩

右剉每服三錢薑棗煎服

當歸拈痛湯

出濟生拔萃

治濕熱為病肢節煩疼肩背沈重

胸膈不利、兼遍身疼痛、不住手足、脛腫痛不可忍

羌活

兩半 甘草

炙半兩

酒黃芩

兩半

茵陳葉

酒炒兩半

人參

苦參

酒洗

升麻

葛根

蒼朮

各二兩

當歸身

知母

酒浸各三錢

防風

錢二

澤瀉

猪苓

各三錢

白朮

一錢半

右咬咀、每服一兩水二大盞、半浸藥、少時煎至一大

盞、去滓、溫服、空心食前、待少時、以美饍壓之、臨卧一

服、不須飯壓、一方無當歸、用黃芩二錢、炒黃色、右

本草十劑云、宣可去壅、通可去滯、內經云、濕淫所勝



治以苦溫羌活苦辛透關節勝溫防風甘辛溫散經  
絡中流濕故以為主水性潤下升麻葛根苦辛平味  
之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白木味甘  
溫和中除濕蒼朮體浮氣力雄壯能去皮膚間腠理  
濕故以為臣血壅而不流為痛當歸身辛溫以散之  
使血氣各有所歸人參甘草甘溫補脾養正氣使苦  
藥不能傷脾胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃  
芩知母茵陳寒乃苦以泄之者也凡酒製炒以為因

用治濕不利小便非其治也猪苓甘草平澤瀉鹹平  
淡以滲之又能導其留飲故以為佐氣味相全上下  
分消其濕使壅滯之氣得宣通也

苓朮湯

出澹  
寮方

治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不

遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎斜手足  
蹇曳皆濕熱類也

附子

炮去  
皮臍

茯苓

白朮

乾薑

炮

澤瀉

桂心

各

分

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

葶藶木香散

出宣明論

治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便赤

澁大便滑洩膝脛腫滿

葶藶

茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

各一分

木香

半錢

澤瀉

木通

甘草

各半兩

揀桂

一分

滑石

三兩

右為末每服三錢白湯調下食前此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此

乃濕熱痞閉極深而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳勉以救之則少少與服之則稍稍導散微似得所漸以加之以意消息一方無白朮

不換金正氣散

出仁齋直指方

治傷濕四肢重著骨節疼痛洒

浙咳嗽

厚朴

去皮薑汁製

藿香

去枝土

甘草

半夏

炙

蒼朮

米泔浸

陳皮

去白

加木瓜

每藥一兩只用五分

右各等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子  
二枚煎至八分去滓食前稍熱忌生冷油膩一方治  
傷濕咳嗽加赤茯苓乾生薑煎服一方無蒼朮

白朮散

出三方

治五臟傷濕咳嗽痰涎增寒發熱上氣喘

急

白朮

二兩

五味子

茯苓

各一兩

甘草

錢半夏

四箇洗去滑皮

破作十  
六片

右剉散分作十六服每服水一盞半生薑五片紅棗

三枚煎至七分空心服之

左經丸

出德生堂

治筋骨諸疾手足不能行步運動

草烏

肉白者生用去皮臍

木鼈子

去殼研

白膠香

五靈脂

各三

兩半當歸

班猫

一百箇去翅足醋炙熟

右為細末用黑豆去皮生粉一斤醋煮糊為丸雞頭大每服一丸溫酒磨下此藥能通榮衛導經絡專治心腎肝三經服得小便少淋澁大有奇驗但不曾鍼灸傷筋脈者四五丸必効

牽牛丸

出宣明論

治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石

各等分

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後量虛實加減服之

五苓散

出醫方大成

治傷濕有熱小便赤少

方見中暑類

獨活散

出活人書方

治傷風濕

羌活

獨活

並去蘆頭

枳殼

炒去穢麩

防風

黃芩

細者

麻黃

沸湯泡三人

參

細辛

華陰者

甘草

細剉炒赤

白茯苓

蔓荊子

甘菊花

各一兩

石膏

水飛過二兩

右搗羅為末每服三錢水一盞生薑三片薄荷四五

葉同煎至八分去滓微熱呷如年高者以川芎代黃

芩

知母乾葛湯

出活人書

治風濕身體灼熱甚者

知母

三錢

乾葛

八錢

石膏

六錢

姜蕤

五錢

甘草

炙

黃芩

木香

升麻

人參

防風

杏仁

炒

天南星

生

羌活

川芎

各二兩

麻黃

去節

四錢

湯炮焙乾



右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服未効再服之

五痺湯

出如方

治風寒濕氣客流肌體四肢頑麻不仁

羌活 防己 白朮 片子薑黃 海桐皮

當歸

白芍藥

各一兩

甘草

半兩

右咬咀薑十片水二盞煎八分病在上食後服病在

下食前服

除濕湯

出一百選方

治一切中濕自汗淅淅惡風翕翕發熱

陽虛自汗呼吸少氣風濕風溫表實裏虛表虛裏實  
腠理開疎氣道壅塞虛汗盜汗目黃身腫小便不利  
胸膈溢滿腰疼體痛嘔吐涎沫葛丞相云甚有效驗

白朮

白茯苓

蒼朮

米泔浸

藿香葉

去土

甘草

橘紅

厚朴

半夏

各一兩

附子

六錢炮

生薑

二兩

右厚朴半夏生薑一處擣作餅子焙乾同衆藥為籠  
末每服三錢水二盞薑皮十片煎至一盞不拘時服

輕脚九

余居士選奇方

逐風去濕消腫行血止痛

地膚子

一兩

白朮

半兩

赤茯苓

半兩

木猪苓

半兩

皮去秤

舶上茴香

炮

澤瀉

赤芍藥

紫蘇葉

葫蘆芭

檳榔

俱半兩

枳實

半兩

麩炒去穰

桃仁

一兩

去皮尖及

雙入麩炒秤

右除桃仁外一處拌和令勻擣羅為末入桃仁煉蜜

為丸擣三五百杵作如梧桐子大每服三五十丸空

心紫蘇湯下加至百丸舊有寒濕之疾每發時痛不

可忍呻吟之聲徹於外幾瀕於死忽遇道人授此方

才服半料間或發作頓覺減前時服盡全料厥疾遂

瘳信而服之其驗如神

薑朮湯

出衍藥院方

溫和中氣外退寒濕治陽虛裏寒外挾

風冷頭痛惡風戰慄多汗風濕相搏擣身體疼痛腰背強直轉側不能又療食寒飲冷內傷脾胃嘔逆吐痰不思飲食

川薑

白朮

炒

茯苓

各一兩

附子

炮去

皮臍

甘草

炙各

半兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

七味除濕湯

出澹寮方

治寒濕所傷身重體痛腠理開汗出

大便澹泄小便或澁或利腰脚酸疼腿膝浮腫及胃

寒嘔逆悉主之

半夏麴

炒

厚朴

薑製

蒼朮

米泔製

各二兩

藿香葉

去土

陳橘皮

白赤茯苓

去皮各一兩

甘草

炙七錢

右剉每服四錢水一盞半生薑七片棗二枚同煎至

七分去滓食前溫服

十八味流氣飲

出朱氏集驗方

治一身受風寒濕熱諸邪毒週

偏氣脈上下不和

羌活 獨活 人參 枳殼 陳皮 白朮

木香 防風 川芎 當歸 桂皮 白芍藥

甘草 白芷 黃芪 天台烏藥 白茯苓

右等分為細末用棗湯調下

省風散

出朱氏  
集驗方

治氣不和為風寒邪濕之氣著於手足

麻痺頭重偏疼起居旋運四肢倦怠足脛緩弱掣痛

無時每遇陰晦神氣不清痰氣相逆並宜預服

羌活 防風 甘草 白茯苓 各半 木香 一分

人參

陳皮

各三錢

天台烏藥

三錢

白朮

一兩

南星

兩半

重者一隻炮去皮切如豆大

附子

九錢炮去皮臍切

右咬咀每服四錢薑十片大棗二枚煎八分不拘時

候服

黃耆六一湯

出朱氏集驗方

治風濕相搏肌肉潤動先服滲濕

湯次用是藥

黃耆 當歸 甘草

右等分咬咀水一盞薑棗煎空心服

騙馬丹

出朱氏集驗方

治風濕相搏手足疼痛及諸傷百損

骨碎補

毛去

自然銅

醋煨

虎脰骨

酒炙

敗龜

酒炙各

川烏

炮

草烏

炒去尖各四兩

半兩錢

醋煨

牛膝

地龍

去土

五靈脂

當歸

乳香

沒藥

川芎

羌活

草解

炙

藁本

天麻

防風

歲靈仙

去苗各半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十丸溫

酒下病在上食後服病在下食前服遍身疼痛不拘



# 時服

除濕丸

家藏經  
驗方

黑牽牛

一斤炮  
帶性

破故紙

四兩

赤芍藥

四兩

錢子地龍

四兩

去土已  
上作末

白膠香

四兩  
另研

右用不蛀皂角三十錠柳取漿入沙鉢內慢火熬成膏子和藥丸如梧桐子大每服四十九空心鹽湯下才利便止老人虛人不宜服 臨安南山招慶院文僧正者窠山為文室設塌其中久之為濕氣所逼半

年足不能舉因得此藥乃能行遂求其方余在淳安

忽左足沈重恐是濕氣依方製服洞下即愈

茵陳湯

出如宜方

治受濕癢熱發黃小便赤澁引飲

茵陳

一兩半

山梔子

十箇

大黃

半兩

右咬咀水煎如受濕輕宜增味導赤散

藿香正氣散

出如宜方

治寒濕所傷身重腰脚酸疼或浮腫

厚朴

製陳皮

製白朮

桔梗

各三兩

甘草

二兩

半夏麴

二大腹皮

白芷

茯苓

紫蘇

藿香

各三兩

右咬咀薑水煎服

獨活散

出朱氏集驗方

治行履費力因卧濕地而得之胡伯才

感此疾得唐接骨傳此方一服而愈

獨活

五兩

川椒

三兩

草烏

半斤

麻黃

三兩

防風

二兩

杉木節

一兩

荊芥

一把

葱

一小握

右煎湯熏蒸通得手用葱蘸湯洗以久為度更先服

小續命湯

薑附湯

出十便良方

治風濕體身週重肌自汗出

大附子

生一兩

乾薑

三兩

甘草

半兩

右為飲子每服四錢加生薑五片水一大盞不計時

煎服

附子酒

出十便良方

治風除濕溫絡散寒邪

附子一箇

半兩已上者慢火炮去皮臍切作片子

右用無灰酒五升浸附子春五夏三秋冬各浸七日  
每溫服一盞常令酒氣不斷食後一方水煎入鹽空  
心食前如疑更入生薑五片同煎亦得

二生湯

出十便良方

治體虛有風外受寒濕身如在空中

生附子

生天南星

各等分

右咬咀每服四大錢水一盞半生薑十片慢火煎至八分去滓服戊午年予在新安有此疾張醫博子發授此方用三服愈

微御湯

出指南方

治脾中濕熱

微御

一兩一分

澤瀉

二兩半

白朮

二兩半

右為細末每服三錢米飲調下

祕傳循經九

出朱氏集驗方

治男子婦人兒童室女諸經絡風

邪寒濕氣血留滯流注作痛筋脈攣拳並皆治之常

服亦可

南星

三兩炮

地龍

三兩去土

川當歸

三兩酒浸

川烏

三兩炮去皮臍

豆餅

二兩用黑豆不拘多少去皮好酒煮候酒乾搗碎捻作餅子晒乾用

乳香

沒藥

各一兩

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十九用溫酒送下不拘時候服

循絡丸

出朱氏集驗方

治風濕流襲足膝筋骨肌肉疼痛外祖

母久苦此疾不得痊服此藥而愈

五靈脂

二兩

北防風

去蘆

川草薢

炮去皮

狗脊

去毛

大蒼朮

米泔浸

虎骨

打碎酒煮

川烏

生用各一兩

草烏

一兩炮去皮

沒藥

一兩

去砂乳香

半兩研去砂

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服三十九加

至五十九溫酒食前送不飲者木瓜湯下此藥可以

常服如痛大作則以小續命湯加檳榔羌活青皮煎

湯痛止則勿服蓋老人恐氣虛體弱則易耗氣爾

滲濕湯

出十便良方

治風虛濕冷頭項拘急肢體疼倦或半

身不遂手足麻痺或內積陰寒腹脇脹滿飲食不進  
便利無度或風濕相搏自汗短氣筋脈抽掣並皆治  
之

蒼朮

陳皮

去白

官桂

縮砂仁

厚朴

附子

乾薑

各四兩

甘草

二兩

右為飲子不計時以生薑五片棗一箇煎十銖服



又方

出十便良方

蒼朮

二兩半

附子

乾薑

厚朴

肉苁蓉

陳皮

細辛

桂

縮砂仁

各一兩

甘草

丁香

各半兩

右為飲子每服三錢生薑五片京棗一枚同煎

薏苡仁煎

出十便良方

治寒濕搏襲經絡筋脈攣急腿膝重

痛行履艱難宜服之

薏苡仁

虎骨

各八兩

天麻

防風

附子

羌活

桂心

各四兩

乳香

二兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九煎防風湯下不拘時候

荖葱丸

出衛生寶鑑

治寒濕筋骨冷痛不能舉動

川烏頭

去皮尖生用三錢

鹽豉

三錢

黑牽牛

頭末三錢

乳香

一錢

沒藥

一錢別研

右為細末用肥葱一握洗去土用淡醋一升不犯銅鐵文武火煮葱醋一斤漉去滓慢火再熬成膏滴水  
中不散為度將前次末和成劑如桐子大每服一十

九或加至二十九溫酒送下大便微利則愈

術附湯

出指南方

治寒濕之證

白朮

四兩

芍藥

一兩

附子

一兩半

炮

去皮臍

甘草

二兩

炙

右為麤末每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎一盞

去滓溫服

真定府張大年二十九素嗜酒至元辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝臑亦然身體沈重心下痞不欲食食則欲吐面色痿黃精神短少至六月診其脈沈而

緩者脾也難經云膺主體重節痛膺者脾土所主四肢屬脾蓋以素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故為腫痛內經云諸濕腫痛皆屬脾土仲景曰濕流關節肢體煩疼此之謂也以大羌活湯治之

大羌活湯

出衛生寶鑑

羌活

錢一升麻

錢一蒼朮

錢半獨活

錢七防風

錢五茯苓

錢五

澤瀉

錢五葳靈仙

錢五當歸

錢五白朮

錢半

內經以濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又

云風能勝濕羌活獨活苦溫透關節勝濕故以為君  
升麻苦平歲靈仙蒼朮防風苦辛溫發之者也故為  
臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫益  
氣緩中澤瀉鹹平茯苓甘平又能利小便導其濕以  
淡滲之者也使風味相合上下分散其濕也

右咬咀都作一處水二盞煎至一盞去滓溫服食前  
一服食後一服忌酒濕麵及生冷硬物不數日良愈

腎著湯

出如方

治中濕小便自利

經云治濕不利小便

非其治矣又云中濕者脈多沈緩而微關節一身盡痛

人參 乾薑 白朮 甘草 茯苓

各等分

右咬咀每服四錢水煎服

除風濕羌活湯夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩冤而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓猪

苓黃藥知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減  
常服藥亦須用酒黃藥二分或三分如更時令清燥  
之氣大行却加辛溫瀉之若濕氣勝風證不退眩暈

麻木不已

方見本門中寒類

治當風卧濕遇冷所中等病

用黃粱米作飯食之

羌活湯治風濕久不解攻注經絡走注疼痛不可忍

川芎 羌活 防風 肉桂 赤芍藥 牡丹皮

當歸 續斷 白芷

各一兩

用薑棗水煎溫服食前

普濟方卷一百十八



欽定四庫全書

普濟方卷一百十九

明周王朱橚撰

積熱痼冷門

總論

一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾夫人一身不外乎陰陽氣血相與流通焉耳如陰陽得其平則疾不生陰陽偏勝則為痼冷積熱之患也所謂痼冷者陰陽沈痼而不解也積熱者陽毒蘊積而不散也故陰偏勝則偏

而為痼冷陽偏勝則偏而為積熱古賢云偏勝則有偏  
害偏害則治偏勝不可不察也大抵真陽既弱胃氣不  
溫復啖生冷冰雪以益其寒陰沍於內陽不能勝遂致  
嘔吐涎沫畏冷憎寒手足厥逆飲食不化大腑洞泄小  
便頻數此皆陰偏勝而為痼冷之證也其或陰血既衰  
三焦已燥復餌酒炙丹石以助其熱陽熾於內陰不能  
制遂致口苦咽乾涎稠目澁膈熱口瘡心煩喜冷大便  
閉結小便赤淋此皆陽偏勝而為積熱之證也施治之

法冷者熱之熱者冷之痼者解之積者散之使陰陽各得其平則二者無偏勝之患矣 常政大論云治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之 夫治熱以寒溫而行之者有三皆同大熱在身止用黃芪人參甘草此三味者皆甘溫雖表裏皆熱躁發於內捫而肌熱於外能和之汗自出而解矣此溫能除大熱之至理一也熱極生風及左遷入地補母以虛其子使天道右遷順行諸病得天令行

而必愈二也況天熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使正氣旺三也治寒以熱涼而行之者何也此亦有三皆同北方之人為大寒所傷其足腫脹乃寒勝則浮使之然也若火灸湯浴必烙肌見骨以新汲凉水浴之少時見完復矣更有大寒凍其面或耳若近火湯浴必脫皮或瘡須先於涼房處停步時以溫手烙熨必能完復此涼而行之除其大寒之理一大寒之氣必令母實乃地道右遷入肺逆行

於天以涼藥投之使天道右遷而順天令諸病得天令  
行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地下者乃三  
焦包絡天真元氣所居之根蒂也熱伏於中元氣必傷  
在人之身乃胃也以涼藥和之則元氣充實而不傷三  
也

諸熱論

黃帝曰病熱當何禁之歧伯曰病熱少愈食肉則復多  
食則遺此其禁也因熱稍愈猶未盡除不戒飲食勞動

情慾擾亂致脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟  
皆熱者以熱病乃傷寒之類也人之傷於寒則為病熱  
寒毒薄於肌膚陽氣不能散發而內為鬱結故傷寒者  
反病為熱熱雖甚不死奈巨陽為首巨陽者諸陽之屬  
也諸陽為熱主氣諸陰為寒主血為熱病已愈其有復  
作謂病已衰而熱有餘所藏熱與穀氣相搏兩熱相合  
故有所遺之熱也雖邪氣稍退因遺熱在故當復作五  
臟俱熱者皆可現肝熱左頰先赤心熱額先赤脾熱鼻

先赤肺熱右頰先赤腎熱頤先赤肝熱者小便黃腹痛  
多卧身熱熱爭則狂驚脇滿手足躁而不得安卧心熱  
者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤  
無汗脾熱者頭重頰痛心煩顏青欲吐身熱熱爭則腰  
痛不可仰腹滿泄兩頷痛肺熱者毫毛淅然厥起惡風  
寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走胸壅背不得直頭痛  
不堪汗出而寒腎熱者腰痛髀骨若折數飲身熱熱爭  
則項痛而強齬寒且痠足下熱不欲言經曰汗出脈躁

盛一死脈不與汗相應其病二死狂言失志者三死皆是怫熱鬱結不能解散以致危殆素問諸熱瞀瘵暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭胸腫疼痠氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也夫腎水真陰本虛心火狂陽積熱已甚以致風熱壅滯頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脈拘攣胸膈痞滿時或痛悶或鼻塞鼽衄口舌生瘡咽喉不利牙齒疳蝕或徧身生瘡癬疥或睡語咬牙驚惕虛汗或健忘心忪煩燥多睡或大小便澁滯或煩熱



腹滿或酒食積毒勞役過度中外一切勞損神狂氣少  
心志不寧口苦咽乾飲食減少變生風熱諸疾虛羸困  
倦或久病瘦瘠及老弱虛人或脾腎經虛風熱燥鬱色  
黑齒槁身瘦焦痿或熱中煩滿飢不欲食或脾盛消食  
善食而瘦或消渴頭面多虛浮數小便或服甘辛熱藥過  
度變成三消上則消渴中則消中下則消腎小便白膏  
也 凡人患大熱皆須候脈若人大熱者不得一準方  
用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍若大熱

甚乃至十倍用之乃可制之爾有人若熱不已皆由服金石所致種種服餌不能制止惟朴硝煎可以定之武德中有高貴人師市遺之紫雪散方此方祇用二硝寒水石石膏可也可不用金有金者高貴人所加也

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝治暴熱者局方雄黃解毒丸積熱者局方妙香丸暴熱心肺上喘者謂之高喘木香金鈴散主之上焦熱而煩者大黃散主之臟腑

秘者牛黃散主之有上焦熱而無他證者桔梗湯主之  
有病久憔悴發熱盜汗謂之五臟齊損此熱勞骨蒸之  
病也損瘦弱虛煩腸癖下血皆蒸勞也治法宜養血益  
陰熱能自退此謂不治而治也錢氏地黃丸主之煎酒  
麵煎燂雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉夫人偏陰  
不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷熱得中而已矯  
枉過正識者憂焉然則欲去積熱將何如曰三黃湯丸  
第一藥耳雖丸熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不

可關熱能傷血四順清涼飲又不可無此窮源探本之  
論也若夫酒後之麴飯後之酒最易積熱又當防於未  
然經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸燥狂越皆  
屬於火內喘而潮燥言識結中便溢外攻即腫毒目赤  
瘡堵咽喉火熱炎上治以寒涼酸苦滌腸泄而勿補

方

紫雪

出和劑方

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易

呌走瘴疫毒厲卒死溫瘧五尸五症心腸諸疾疔刺

痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野  
道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金

一百兩

石膏

寒水石

磁石

滑石

已上四味各三

兩斤搗碎水一斛煮至四斗去滓入下項

犀角屑

羚羊角屑

青木香

搗碎

沈香

搗碎各五兩

玄參

洗焙搗碎

升麻

各一斤 甘草

剉炒

丁香

一兩搗碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下  
項

朴消

精者十斤

硝石

四升如闕芒硝亦得每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

硃砂

飛研三兩

麝香當門子

一兩三錢半研

已上二味入前藥中攪調令勻寒之二日

右藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減食後服

消痞丸

出宣明論

治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿

嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢體焦𦦳  
眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄  
血下為大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶痺熱消渴  
傳化失常小兒疳積熱

黃連

去鬚

乾葛

各一兩

青黛

研一兩

牽牛

二兩

黃芩

大黃

黃蘗

梔子

薄荷

藿香

厚朴

去皺皮

茴香

炒各半兩

木香

揀桂

各二兩

右為細末滴水丸如小豆大每服十九丸新水下溫水

亦得小兒九麻子大病本濕熱內餘本自利者去大黃牽牛忌發熱諸物

龍腦九

出本事方

治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥脾疸口乾大

夫吐血婦人血崩並皆治之

真蒲黃

一兩

麥門冬

去心二兩

阿膠

一兩

甘草

一兩半

人參

一兩

川當歸

去蘆一兩

黃耆

一兩半

木通

一兩

生乾地黃

三兩

龍腦薄荷

五兩

淨葉

柴胡

右為細末鍊蜜丸如桐子大每服二十九病上焦飯



後用熟水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之

犀角丸治積熱胸膈有停滯

犀角 黃連 黃芩 橘皮 滑石 大黃

各三兩

牽牛頭末 四兩 檳榔 木香 薄荷 青皮 川芎

各一兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服九數量人虛實常服溫暖丹田

麝香上清丸

出仁存方

治心經有熱咽膈不利目赤口渴小

便不利

辰砂

一兩

馬牙硝

天竺黃

甘草

各半兩

海金砂

防風

滑石

麝香

腦子

各一分

牛黃

錢半

吉荷

兩半

右研細蜜丸每一兩作十五丸金箔為衣每服一九  
細研薄荷湯下一方有川芎防風石膏各一兩餘藥  
同煎一方無吉荷

真珠散

出和劑方

治男子婦人五臟積熱毒氣上攻心胸煩

悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服之

苧蓐根末

琥珀

真珠粉

寒水石

煨碎  
醋研

鉄粉

硃砂

飛研

甘草

生

川大黃

牙硝

研枯

右等分為末拌勻每服一錢以竹葉湯溫調下不拘

時候

防風散治積熱上衝頭熱火痛入頂中

防風

去蘆

羌活

去蘆

薄荷

去蘆根

當歸

去尾

大黃

梔子

去皮

川芎

各一兩  
兩 蟬退 二十箇  
去足翼 粉草 五  
分

右為散每服四錢水一盞半燈心二十莖苦竹葉十片煎食後服一方無粉草

碧雪治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩燥嚙食妨悶或喉閉壅塞寒水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆治之

芒硝

青黛

石膏

煨過  
研飛

寒水石

研  
飛朴硝

硝石

甘草

馬牙硝

各等  
分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦  
不住手攪令硝溶得所却入青黛和勻傾入砂盆內  
候冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚙津不拘  
時候如喉閉塞壅不能嚙物者即用小竹筒吹藥入  
喉中即愈頻神効

天門冬飲治上膈壅盛咽喉腫痛唇焦舌乾腮頰生瘡  
痰熱煩渴

天門冬

去心三分

紫蘇葉

兩半

百藥煎

兩半

黑參

細實者湯浸洗焙乾

牛旁子

炒

甘草

微炙已上三味各一兩

人參

去蘆頭

礪砂

別研

腦子

別研已上三味各二分

右為細末和勻煉蜜為丸每一兩作二十九每服一

丸細嚼生薑湯下食後臨卧服

涼膈散治大人小兒腑臟積熱煩燥多渴面熱頭昏唇

焦咽噪舌腫喉閉目赤鼻衄頤頰結硬口舌生瘡疾

實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澁便

溺秘結一切風壅宜服一方加黃連半兩名黃連清

心湯

川大黃

朴硝

甘草

燼各二  
十兩

山梔子仁

薄荷葉

去  
梗黃芩

各十  
兩連翹

二斤  
半

右粗末每服三錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利主服一方咽嗑不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半兩欬而嘔者加半夏二錢半生薑煎鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩一料

內如淋閤加滑石四兩茯苓一兩或閤而不通臍下  
収如覆碗痛閤不可忍乃腸胃乾涸臙中氣不下故  
經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣  
故臙中者臣使之官名三焦相火下合在腎為氣海  
也王注曰膀胱津液之腑胞內居之腹少處間毛  
內藏胞器若得氣海之氣施化則溲便下注氣海氣  
之不及則閤飲不通故不得便利也先用木香沈香  
各三錢酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通達



小便自通經所謂病在下上取之 王注曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之

七寶洗心散治寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯及風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅塞涕唾稠粘心神煩燥眼澁睛疼一名瀉散

大黃

麴裹煨  
去麴焙

芍藥

甘草

炙

麻黃

不去節

當歸

荊芥穗

各六兩

白朮

右為細末每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉同煎  
七分溫服小兒麩豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風  
天吊可服一錢並臨卧服大人五臟壅實欲要溏泄  
加至四五錢熱服

天笠散治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子

去殼

連翹

各三錢

甘草

三兩二錢

荏荑根

二兩六錢

雞冠雄黃

半錢

鬱金

用皂角水浸切片焙乾三錢

天竺黃

五錢

右為末每服一錢食後臨卧新汲水調一方無天竺黃

朴硝煎

朴硝

一斤芒硝

八兩

寒水石

四兩

石膏

金

各二兩

右先納二硝於八升湯中攪令消以好紙密封一宿  
澄取清納銅器中別擣寒水石石膏碎如豆粒大以  
絹袋盛之納汁中以微火煎候其上有沫起以筴投  
中著勤如凌雪凝白急下瀉著盆中待凝取出烈日  
曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水  
五合攪和令消頓服之日三服熱定即止

治積熱方

枳實 黃芩 大黃 黃連 芒硝

各二兩

右為末蜜丸如桐子大空心酒服三十九加至四十  
九日一服

治熱蜜煩滿不能食

以猒發生擣汁服三四合多則令人吐

治熱氣消食

以檐羅雜昆布為羹食之

消毒麻仁丸治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸  
膈不利頭旋目運或因酒麵炙煇毒食所傷停留心  
肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外  
則發瘡瘍癰瘡赤斑遊腫渾身燥悶面上瘡赤口乾  
舌裂咽喉溢痛消中引飲或傷寒時變口鼻出血煩  
燥者及風毒下疳瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風  
熱毒氣並皆治之

杏仁

生去皮  
尖二兩

大黃

生五兩

山梔子仁

十兩

右為末煉蜜為丸每服三十九至五十九夜卧溫湯  
吞下利下赤毒膠涎為効服時隨意加減此藥甚穩  
善不損臟腑常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜  
湯化下三五丸極効

青黛解毒丸治大人小兒五臟積熱毒氣上攻胸膈煩悶  
咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡  
精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧及傷暑毒面赤身熱  
心躁煩渴飲食不下

寒水石

研

石膏

研各十  
六兩

青黛

右細研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調為丸如雞  
頭大每服一九食後新汲水化下或細嚼用生薑水  
下亦得如中諸毒並宜服之及小兒驚風潮熱痰涎  
壅塞心胸煩燥頰赤多渴睡卧不穩每三歲兒可服  
半粒更量歲數加減與之

無憂散治諸熱譫語精神昏冒及裏有蓄熱

天南星

牛膽製為  
末一兩

腦子

半錢

右同研勻每服三錢濃煎人參湯調下如人行三里  
地更飲人參湯一盞投之須臾下惡物為度累用有  
効

青心丸治經絡中熱煩滿心忪恍惚膈熱夢遺不可全  
作虛冷亦有經絡熱而得之也

黃蘗

二兩  
生用  
龍腦  
錢二

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一十九臨卧  
麥門冬湯送下



玄明粉治邪熱所干膈上氣滯五臟祕澀

用朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明  
自然結成青白塊子用瓷罐子按實於炭火內從慢  
至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煅便取  
出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為  
細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨卧  
斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下此  
藥本性寒燒過性溫無毒忌諸般魚及毒物等

又方治寒熱虛熱上攻口瘡

用附子一箇炮去皮臍切片水兩大碗煎至一小碗  
入沈香末二錢再略煎候冷服空心早晨先服黑錫  
丹百粒大要治虛熱上攻者一方用四味黃耆建中  
湯煎放冷服亦妙

當歸龍膽丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐  
搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩飢肉咽癰胸膈痞  
塞咽嗑不利腸胃燥澁小便淋悶筋脈拘苛

音荷急也重也

肢體痿弱暗風癰病小兒急慢驚風常服宣通血氣  
調順陰陽病無再作

當歸

焙

草龍膽

大梔子

黃連

黃蘗

黃芩

各一兩

大黃

蘆會

青黛

各半兩

木香

一分麝香

半錢別研

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒麻子大生薑湯每  
服二十九忌發熱諸物宜兼服防風通聖散一方加

牽牛二兩

既濟清神飲益腎水降心火清上實下

桔梗 黃芩 川芎 當歸 茯苓 羌活

白木

山梔子

兩各一

薄荷

甘草

知母

兩各半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調服

麥門冬散治男子婦人蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥睡多不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

小草

去心

黃連

去鬚

升麻

去麤皮

犀角屑

甘草

枳殼

炒 黃芩

去穰 黃芩

大青

去根各半兩

芒硝

一兩

麥門冬

去心三分

右為細末每服三錢水一盞煎至七分食後溫服  
導赤丸治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋  
瀝不宣或服補藥過多水道塞澁出少起數臍腹急  
痛攻疰陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰  
腫發背血脈瘀閉服此排膿內消腫毒疎導心經邪  
熱應內蘊風熱五般淋疾皆治之

赤芍藥

茯苓

去皮

滑石

各四兩

生地黄

焙

木通

去節各半

斤 大黃

炒十兩

山梔子

炒二十兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九至三十丸食後用溫熟水吞下

烏梅丸生津止渴涼咽膈

好百藥煎

一斤

烏梅肉

一斤

朴硝

二兩

砂仁

半兩

香白芷

薄荷

三兩

豆粉

五兩

右為極細末甘草膏和丸龍眼大含化

龍腦飲子

出和劑方

治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼

口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱咳嗽

中暑煩燥一切風壅並宜服之

縮砂仁

荻萋根

各三兩

藿香葉

二兩

石膏

四兩

甘草

蜜炒十兩

大梔子

微炒十兩

右為末每服一錢至二錢用新汲水入蜜調下又治傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六片煎至七分溫服並食後服一方有薄荷

牛黃膏

出濟生拔萃方

治熱入血室發狂不認人者

牛黃

二錢半

硃砂

鬱金

各三兩

腦子

甘草

牡丹皮

錢三

右為細末煉蜜為丸如皂子大新汲水化下

加減大府丸

出御藥院方

治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澀

木通

一兩半

黃連

去鬚三分

黃芩

去黑皮一分

赤茯苓

去黑皮半兩

生乾地黃

洗切焙一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九至四十丸食後溫水下

消毒犀角飲

出和劑方

治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰



涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰毒腫聚遍身風癩瘡  
毒赤瘤及瘡癰已出未出不能快透並皆治療小兒  
疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消  
毒効

防風

去義  
八兩

荊芥穗二斤甘草

炙十  
六兩

鼠粘子

炒六十  
四兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

大便實加大黃用

牛黃瀉心湯

出御藥  
院方

治心經邪熱狂語精神不爽

腦子

牛黃

硃砂

各三錢半

大黃末

生一兩

右用研極細每服三錢涼生薑蜜水調下

龍腦丸

出宣明論

治大人小兒一切蘊積熱毒不散及陰癰

疹

龍腦

硃砂

硼砂

牛黃

各等分

右末鎔黃蠟為丸米粒大每服三五丸浸甘草人參

湯下無時候

四順清涼飲

一名四順引子

治血脈壅實腑臟生熱煩赤多渴

五心煩燥睡不寧四肢抽掣及因飲食不時寒溫失  
度血氣不理腸胃不調或溫服連滯欲成伏熱不歇  
欲發癰又治風熱結核頭面瘡癰目赤咽痛瘡疹餘  
毒一切壅滯並宜服之

出仁齋直指方

大黃

飯上蒸切焙

赤芍藥

當歸

去蘆

甘草

各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後臨卧溫服小兒  
量大小虛實加減微溲利為度加荊芥穗尤妙

小柴胡湯

亦治血熱  
可擇用

導赤散

出和劑方

治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶

亂傳流不經小便赤澀淋澀臍下滿痛

生乾地黃

木通

甘草

生各等分

右咬咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎至六分去滓溫服無時候

火府丸

出楊氏家藏方

治心肝二經蘊蓄邪熱口燥咽乾大渴

引飲潮熱煩燥目赤睛疼唇焦鼻衄小便赤澀癰閉不通

生乾地黃 黃芩 木通 各二兩 犀角屑 一兩 甘草 三錢

微灸

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸溫熱水下食後去黃芩犀角名導赤飲治病同前

等涼丸 楊氏家藏方 去肝經熱毒清利頭目涼血消壅

黑參 龍膽草 各等分

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸參湯下食後稍空服

清神散

出和劑方

治消風痰化壅涎治頭風目眩心忪面熱

腦痛耳鳴鼻塞聲重口眼賸動精神昏憤肢體疼痛

項背拘急腦膈煩悶咽嗑不下

石膏

研細水飛四兩

薄荷葉

荊芥穗

甘草

炙各三兩

防風

去叉股及蘆頭

人參

去蘆檀香各一兩

細辛

去苗洗焙半兩

羌活

右為細末每服二錢沸湯點服或茶酒調下亦得

石膏散

一名清氣飲

治氣煩燥身熱作渴恍惚驚悸風壅熱

盛涎潮

石膏

一兩半

南星麴

一兩

大黃

煨

僵蠶

炒去絲嘴

粉米

炙各半兩

硃砂

三錢別研

腦子

三錢別研

牛黃

右為末每服二錢食後新汲水調下

團參大乙丹

楊氏家藏方

治諸經蘊熱神情恍惚睡卧不寧

煩燥健忘小便赤澁口苦舌乾頭目昏痛

人參

去蘆頭

酸棗仁

炒

山梔子仁

微炒

阿膠

蛤粉炒各半兩

天南星

牛膽製者一兩

甘草

一兩炙

玄精石

別研

麝香

別研

腦子

別研三味各一兩

辰砂

別研三兩

金箔

十片為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作一十五丸金箔為衣每服一九荊芥茶嚼下食後臨卧服

雞蘇丸

楊氏家藏方

治虛熱上壅頭目不清面赤咽乾痰嗽

煩渴

雞蘇葉

半斤荊芥穗

一兩防風

去蘆頭

黃耆

生用

生乾地黄

桔梗

去蘆頭炒

甘草

炙

川芎

甘菊花

各一兩腦子

半錢別研

右為細末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一九麥



門冬去心煎湯嚼下一方小便赤澁加車前子一分

食後服

補髓丸

出指南方

治四肢熱發

生乾地黃

日乾三兩

乾漆半兩碎炒令烟出

右為末煉蜜丸如菉豆大每服三十丸空心臨卧米

飲下

加減辛夷散治風熱上壅鼻流濁涕或腥臭頭昏眉稜

角痛

以茶調散加辛夷仁藁本蒼耳子木通各一兩為末

淡茶清調下

方見頭門  
首風類

紅雪通中散

出和  
劑方

治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿

食開三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治  
眼昏頭痛鼻塞口瘡重重腸癰喉閉及傷寒狂躁胃  
爛發班等病並宜服之

赤芍藥

人參去蘆檳榔

枳殼

去穰  
炒黃

甘草生用

淡竹葉

木香

各二  
兩

羚羊角屑

三兩

升麻

三兩

黃芩

三兩

梔子

去皮

葛根

桑白皮

木通

大青

去根

藍葉

各一

兩半

川朴

十斤

蘇枋

六兩

硃砂

細研

一兩

麝香

細研

半兩

右除硃砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至九升  
去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴硝  
以柳篦攪勿手住候凝次下硃砂麝香等末攪令勻  
頓新甕盆中經宿即成矣細研每服一錢至二錢新  
汲水調下更量老小虛實等臨時加減服之九服靈  
寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶

投令宣瀉一兩行為度後法服靈寶丹立効

抱龍丸

出和劑方

治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不

寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂燥並

時疾

雄黃

研飛四兩

白石英

研飛

生犀角

麝香

研

硃砂

研飛各一

兩

藿香葉

二兩

天南星

牛膽製十六兩

牛黃

研半兩

阿膠

研炒如珠

三金箔

研

銀箔

研各五十片

右為細末入研藥令勻用溫湯搜和為丸如雞頭實

大每服一九用新汲水化破入鹽少許食後一方有

紫石英無銀箔以熱水浸黃牛膽和藥末為丸

牛黃涼膈丸

出和劑方

治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心

煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口

乾多渴唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黃

研一分

南星

牛膽製七兩半

甘草

燼十兩

紫石英

研飛

麝香

研

龍腦

研各二兩

牙硝

枯過研細

寒水石粉

煨

石膏

研細

各二  
十兩

右為末煉蜜為丸每兩作三十九每服一九溫薄荷人參湯嚼下食後服小兒常服半丸治急驚一九用薄荷水化下

甘露丸

出和劑方

治大人小兒風壅痰熱心膈煩燥夜卧不

安謔語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒

鉛白霜

龍腦

各三分

牙硝

枯過三兩

寒水石粉

二十兩

甘草

炙一兩

右為細末用糯米糊丸如彈子大每服用生薑蜜水

磨下半丸新汲水亦得小兒一九分五服食後

玉露飲

出仁存方

治心肺上膈壅熱煩燥口乾生瘡小便赤

澁並皆治之

寒水石 石膏 滑石

右等分研極細如麵入硃砂如桃花色每服一錢

麥門冬湯調下食後服

甘豆湯

出仁齋直指方

治諸熱煩渴大小便澁

黑豆

二合

甘草

二錢

右入生薑七片井水煎汁服

治卒煩熱

用白鴨肉和葱豉作汁飲之

解煩熱止洩實大腸壓口熱止渴

用粟米糗一名麪味酸寒和水服之

調中下熱氣方

出本草

以泉水多飲之久服却溫

治胸中熱渴或煩心燥



用葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出葛粉相拌勻煮熟食

治膈上煩熱多渴通利九竅

用滑石二兩擣碎以水三大盞煎至二盞去滓下粳米二合煮粥溫食之効

治覺熱四肢不和

用蜜漿一碗飲之甚良

治煩熱止泄痢並渴

用黍米飯食之

大黃除熱湯

出指南方

治陽實發熱

大黃

三兩黃芩

三兩柴胡

芒硝

別研

甘草

各一兩

右為麤末每服五錢水一盞去滓入芒硝一錢許再

煎三兩沸溫服

茯苓丸

出指南方

治四肢熱發逢風如灸如焚此由因陰陽

氣不調陰氣虛陽盛四肢不屬其陽兩陽相搏而陰

氣虛以水少不能滅盛火陽獨活於外久之令人內

消宜

赤茯苓

四兩黃芩二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲吞

下

桔梗湯

出指南方

治四肢發熱

桔梗

二人參

麥門冬

甘草

各半兩

小麥

一兩

右㕮咀水三升煎至一升去滓分三服不拘時候服

竹茹散

出楊氏家藏方

治大腸實熱心神煩燥口内生瘡

羚羊角

三分

青竹茹

兩

黃芩

山梔子仁

黑參

紫蘇葉

木通

杏仁

湯浸去皮尖  
麩炒微黃色

朴硝

一兩  
別研

甘草

半兩  
炙赤

大黃

一兩  
剉炒

右為麤末每服三錢水一盞至六分去滓入生地黃汁一合再煎一兩沸溫服不拘時候

利膈湯

出濟生方

治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜

冷咽喉生瘡疼痛但是一切上壅之證皆可服之

防風

去蘆

雞蘇葉

桔梗

去蘆

牛旁子

川升麻

人參 甘草

炙各半兩

荊芥穗

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓  
溫服不拘時候

黃耆膏子煎丸

出濟生拔萃方

除煩解勞去肺熱嗽衄心熱驚

悸脾胃熱口乾吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不  
定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

人參 白朮

各一兩半

柴胡

黃芩

各一兩

白芷

知母

各半 甘草

半兩炒

鼈甲

一箇半手大者酥炙

右為細末黃耆膏子九如桐子大每服三五十九百沸湯下空心右用黃耆半斤麤末水二斗熬一斗去滓再熬令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩再熬令蜜餚熟得膏十兩放冷九藥

神芎九

出鮑氏丸

治感熱氣閉藏氣不舒而成痛

大黃

三兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩

薄荷

半兩

川芎

半兩

右為末蜜丸每服十九欲泄多服冷氣加丁香

通膈丸

出本事方

治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黃連

茯苓

人參

各三兩

硃砂

一分 真腦子

許少

右細末研勻煉蜜丸如桐子大熟水下三五九日三

二服

牛黃宣毒丸治壅熱內攻胸膈不利或遍身搔痒口唇生瘡咽膈不利與當歸順氣飲子為表裏

大黃

芒硝

黃連

不見火

黃蘗

黑牽牛

微炒各等分

右為細末水丸如梧桐子大每服百丸用當歸順氣飲子送下渾身瘙痒足脛生瘡膿爛腥臭久而不已

用蜜水下二百丸

治膈上熱方

苦參

十兩

玄參

五兩

麥門冬

二兩

車前子

二兩

右為末蜜丸如桐子大一服十五丸日二服

大黃散治上焦虛煩熱不能睡卧

梔子仁

大黃

鬱金

各半兩

甘草

二錢半

右為細末每服三四錢水煎食後服微利則已

滋腎丸治不渴小便閉邪熱在血分也



黃蘗

三兩細剉酒拌陰乾

知母

二兩酒浸陰乾

肉桂

一錢半

右上二味氣俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熟水為丸百沸湯下

青金丹清心解熱陰潮治譫語舌生白胎痰盛氣壅煩渴引飲反時行熱極生風大人小兒均可服並時行熱疫發熱如火連日不愈者

天門冬

去心麥門冬

各一兩

天麻

二分全蝎

大者五箇

牙硝

二錢

天竺黃

分二

礞砂

錢一

雄黃

錢一

白附子

錢二

紫粉

錢四

辰砂

錢一片腦子

半錢

生麝香

半錢

金銀箔

各十片

水粉

兩一

右另研腦麝辰砂水粉金銀箔同前藥末入白麵二兩水丸以靛花為衣如筋頭大每丸用麥門冬生地黃燈心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參尤妙

地黃煎治熱

地黃汁

四升

茯神

知母

姜蕤

各四兩

枯萎根

錢五

竹瀝

三合一方用竹葉

生薑汁

生地骨皮

白蜜

生麥門冬汁

升各二

石膏

兩八

右呖咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下  
竹瀝地黃麥門冬汁微火煎四五沸下蜜薑汁微火  
煎取六升初服四合日三夜一加至五六七合四月  
五月作散服之

半夏湯治胸中客熱心煩滿氣上大小便難

半夏

升一

生薑

兩八

前胡

兩四

茯苓

白朮

兩各五

甘草

兩一

黃芩

人參

兩各二

杏仁

枳實

兩各三

右咬咀以水九升煮取三升分三服胸中大熱者沈  
冷服之大小便澁加大黃二兩一方用梔子仁二兩  
為十一味

防風當歸飲子如煩渴發熱虛煩蒸病空心服地黃丸  
食後服此藥

柴胡 人參 黃芩 甘草 各一兩 滑石 三兩 大黃

當歸 芍藥 各半兩 防風 兩

右為麤末生薑同煎服如痰實咳嗽半夏一方無防風

發表解表升麻湯治遍身壯熱骨節疼痛

升麻

錢一

柴胡

分七

當歸

分五

羌活

蒼朮

錢各一

防風

分八

甘草

分七

藁本

分五

橘皮

分三

加麻黃

春加去節冬

加不去節

右咬咀作一服水煎去滓溫服後以葱醋湯發之

和中丸治口燥舌乾咽嗑不利胸膈痞滿心腹痛悶小

便赤澁大便結實治風氣怫鬱頭目昏眩筋脈拘急

肢體疼痛倦一切風壅常服寬膈美食消痰止逆

牽牛

滑石

各二兩

官桂

木香

各一

大黃

紅花

紅皮黃芩

茵香

一作各半兩

右為末滴水如小豆大每服二十九煎生薑湯下溫水亦得日三服無時候

大黃湯治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇烈喉閉赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡陽明正傷寒發狂見鬼譫語大小便秘一切風壅並皆治之

川大黃

二兩

山梔子

一兩

朴硝

二兩

連翹

二兩

薄荷

二兩

去枝根梗

甘草

一兩

乾葛

二兩

赤芍藥

一兩

兩

右為剉末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜三匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒空心下

又方

白朮

荊芥

赤芍藥

各三兩

大黃

車前子

各二兩生

用木通

三兩

甘草

二兩

當歸

右為細末大便秘結米泔調三錢空心服上膈壅熱或生丹毒或如癰癤用水二盞煎二錢服小便結如淋狀用蘆根打碎淨洗煎湯調下五心煩熱生薑二

片同煎三錢服

涼藥九子治五臟伏熱痰壅煩燥口舌生瘡大便秘小

便赤澀小兒驚疳

連翹

一兩半

牙硝

甘草

生各一兩二錢

大黃

一兩石膏兩半

薄荷葉

梔子

菹豆粉

各二分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一二丸水化食後

日進二服

治心肺五臟熱毒氣



用苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服  
木通散治諸熱利小便

生乾地黄 木通 荊芥 地骨皮 桑白皮 炒

甘草 炙 北梗 各等分

右剉每服三錢薑三片同煎服

竹茹湯治虛心煩悶內熱不解

竹葉 麥門冬 去心人參 茯苓 去皮小麥 炒半夏 泡

一兩 甘草 半兩 炙

右吹咀每服四錢用水一盞半薑五片煎至七分去滓不拘時候溫服

木香金鈴散治暴熱心肺上喘不已

大黃

兩半

金鈴子

錢三

木香

錢三

輕粉

少

朴硝

錢二

右為末桑白皮湯調下食後三錢或四錢以利為度

喘止則已

犀角散治五臟積熱

黃連

大黃

芍藥

犀角

甘草

各等分

右為麤末每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服無時

細丸治客熱結塞不流利方

大黃

葶藶

錢各三

香豉

合二

杏仁

巴豆

錢各五

右五味為末蜜丸如桐子大每日飲服二丸以利為

度

管仲散解一切諸熱毒或中食毒酒藥毒等並皆解之

黃連

管仲

甘草

錢各三

駱馳峯

錢五

右為細末每服三錢冷水調下

神芎丸治一切熱證常服治腎水真陰本虛心火狂陽  
積甚以治風熱壅滯頭目昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢  
筋脈拘攣胸膈痞滿時或痛悶或鼻窒鼻衄口舌生  
瘡咽喉不利牙齒甘蝕或偏身多生瘡疥或睡語咬  
牙驚惕虛汗或健忘心忪煩燥多渴或大小便澀滯  
或煩熱腹滿或酒過積毒或勞役過度中外一切勞  
損神狂氣亂心志不安口苦咽乾飲食減少變生風

熱諸疾虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人尤宜服之或脾腎陰虛風熱燥鬱色黑齒槁身瘦耳焦或熱中煩滿饑不欲食或瘕成消中善食而瘦或消渴多飲而數小便宜常服

大黃

黃芩

各二兩

牽牛

滑石

各四錢

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十九至十五丸每服加十九一二服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳或久病熱鬱無問瘦悴老弱并一切須可下者始自

十九每服加十九以利為度如常服此藥但除腸垢積滯不傷和氣推陳致新得便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損頗遂病人心意或熱甚必須及下者便服四五十丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸麻子大凡此一法此藥至善常服二三十丸下利臟腑但有益且無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下也此方除臟腑滑泄者或重寒脈遲者或婦人經病產

後血不止者但孕婦等則不宜服此外一切風熱雜  
病煩悶壅塞神氣不和或平人保養常服自顯其功  
若以効驗觀其藥味則非明本草造化之理者不可  
得而知其然也猶孔子讚易道明顯應化萬仁之善  
而不見其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用因名藏  
用九一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目  
昏眩者愈

大金花丸治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋悶

嗽血衄血瘦弱頭痛並骨蒸肺痿喘嗽大便黃米穀  
完出一法去大黃加梔子名梔子金花丸又名旣濟  
解毒丸

黃連 黃蘗 黃芩 大黃

各半兩

右為末滴水丸如小豆大每服三十九新汲水下自  
利去大黃加梔子半兩小兒丸如麻子大三五丸

四生丸治一切熱疾常服潤肌膚奈老諸熱證皆可服

大黃 牽牛 皂角

各二兩 朴硝半兩



右為末滴水和丸如桐子大每服三十九白湯下百  
十九服至三十九食後服之

當歸承氣湯治熱攻於上不利於下陽狂奔走罵詈不  
避親疎

大黃

當歸

各一兩

甘草

炙半兩

芒硝

九錢

右咬咀每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚煎  
半碗熱服此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實當  
歸補血益陰甘草暖中加生棗胃屬土此引至於胃

中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散加防風藜蘆得吐立愈後調法洗心散涼膈散解毒湯等藥調治之

黃連解毒湯治五臟積熱赤目口瘡咽喉糜爛酒毒煩燥傷寒蓄熱在中身熱狂燥昏迷不食

黃連

黃蘗

黃芩

大梔子

已上各等分

右剉為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服如腹滿嘔吐欲作利者加半夏茯苓厚朴各三錢

生薑同煎如白膿下痢後重者加大黃三錢海藏加  
防風連翹為金花丸治風熱加柴胡治小兒潮熱與  
四物湯相合各半亦治婦人潮熱

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大  
渴引飲心忪面熱煩燥不安目赤睛疼唇焦鼻衄口  
舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉不通及熱  
淋血淋

車前子

瞿麥

萹蓄

或用薄荷代

白滑石

甘草

梔子仁 木通

去皮節

大黃

各半斤

右剉散每服三錢水一盞半用燈心十莖煎食後臨  
卧溫服小兒量力少與之或加麥門冬去心尤妙門儒

事親書加木  
香一兩尤佳

海先丸治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取  
水之精漬於船板木中縷見風日久則日炙變為清  
色以取大陽之氣水見太陽之氣而熾曝中有陰陽  
之氣結而不散聚而為清服之分陰陽去邪熱調腑

臟聖人處治以度物之氣味所用且如東壁牆上土  
取之以新水調化取清水服之治腑臟不調謂脾主  
於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾藉  
太陽真火之氣以除去其濕而吐瀉得止又以魚骨  
入喉中肉不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便  
出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖灰乾糝瘡  
上立已聖人取其物類相感故也且船板青與上同  
意

船板青

五酥油餅末

一兩半

右為細末稀麴和丸如桐子大每服四五十丸酒送

下無時候

黃耆當歸湯治熱上攻頭目沿身胸背發熱目赤面紅  
煩渴引飲晝夜不息其脈洪大而虛重按全無通評  
虛實論云脈虛血虛脈實血實又云血虛發熱證象  
白虎惟脈不長實為辨也若誤服白虎湯死此病得  
之於肌困勞役

當歸身

一錢  
酒洗  
黃耆  
兩半

右咬咀水煎服之食前

牛黃散治一切熱毒黃疸衄血發斑口咽瘡爛吐血便  
血時氣發狂神昏不省

川大黃 鬱金

各一兩

右為細末每服二錢雞子清汁調下加減服之

黃連湯治一切熱血熱眼熱酒熱並主之

用黃連去鬚剉碎以井水浸良久磁碗盛之置鉄鉚

血膈湯洮取清汁服再洮

治五臟邪氣厭穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴疾惡瘡  
用邪蒿以煮令熟和醬醋食之

治骨節熱積漸黃瘦

用大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空  
腹分為兩服如人行四五里服

普濟方卷一百十九